

Adiciones al Catálogo de las Aves Chilenas

PATRICIO DROULLY*

Desde la aparición del "Catálogo de las aves chilenas con su distribución geográfica" (PHILIPPI-B., 1964) se han registrado varias especies y subespecies nuevas para el país, además de una especie nueva para la ciencia. Estas aves, que suman un total de 26, corresponden a 8 aves marinas detectadas en el mar chileno, incluyendo 2 para la Isla de Pascua, 9 migratorias de Norteamérica y 9 endémicas de Sudamérica. No se considera entre éstas a *Curaeus curaeus recurvirostris* MARKHAM, 1971 (An. Inst. de la Pat. 2(1-2): 158-159), debido a que estimamos que su diagnóstico, como el número de ejemplares comparados, ha sido insuficiente para dar validez a

esta subespecie. Se propone mantenerla como sinónimo de *Curaeus curaeus curaeus* (MOLINA, 1782) hasta que su posición sistemática sea definitivamente aclarada.

Se agregan, además, las aves de la Isla de Pascua ya conocidas por la ciencia para esta isla, pero excluidas por PHILIPPI-B. de su catálogo (1964), con excepción de *Sula dactylatra* LESSON y *Sterna fuscata luctuosa* PHILIPPI y LANDBECK, que fueron incluidas en él. Las aves de Pascua irán precedidas de un asterisco para diferenciarlas de las nuevas adiciones.

Se mantiene el mismo orden sistemático seguido por PHILIPPI-B., al igual que la numeración, que será continuación del último número de dicha obra.

* Universidad Católica, Sede Regional del Maule, Talca.

ORDEN PROCELLARIIFORMES
(Albatros y Petreles)

FAMILIA PROCELLARIIDAE

SUBFAMILIA FULNARINAE

- 477 **Pachyptila turtur** (KUHLE) Petrel-paloma de pico corto
Procellaria turtur KUHLE, 1820, Beitr. Zool. p. 143. (Estrecho de Bass)
Anida en islas subantárticas de Australasia y del Océano Indico. De distribución muy extensa, ha sido capturado en el Atlántico Sur. En Chile se encontró un ejemplar moribundo en la playa de Arica, 1966 (PHILLIPI-B., 1967).

SUBFAMILIA PUFFININAE

- 478 **Puffinus gravis** (O'REILLY) Fardela capirótada
Procellaria gravis O'REILLY, 1818, Voy. Greenland, adj. Seas, etc. p. 140, lám. 12, Fig. 1 (Cabo Farewell y Staten Hook a Terranova).
Nidifica en Tristán da Cunha e Islas Diego Alvarez (Gough); migra hacia el Atlántico Norte. Visitante ocasional, ha sido observada en las costas orientales del Estrecho de Magallanes por WATSON y ANGLE en enero de 1966 (HUMPHREY P. S. et al., 1970).
- 479 **Puffinus nativitatis** STREETS Fardela de la Isla Christmas
Puffinus (Nectris) nativitatis STREETS, 1877, Bull. U. S. Nat. Mus. 7 p. 29 (Islas Christmas, Océano Pacífico).
Otros nombres: Kuauá (en Isla de Pascua).
Pacífico tropical. Nidifica en Islas Christmas, Laysan y Wake y en Archipiélagos Phoenix, Marquesas, Tuamotu y Austral. Ha sido encontrada nidificando además en Motu-Nui, pequeña isla contigua a Isla de Pascua (MILLIE y JOHNSON, 1970).
- 480 **Puffinus assimilis** GOULD Fardela chica
Puffinus assimilis GOULD, 1838, Syn. Bds. Austr., pt. 4, app., p. 7 (Nueva Gales del Sur = Isla Norfolk).
Nidifica en islas Diego Alvarez (Gough) y Tristán da Cunha; también en numerosas islas del Océano Indico y cercanías de Nueva Zelandia. En el Pacífico nidifica en las islas Galápagos; en Chile fueron capturados varios ejemplares frente a la Isla de Chiloé por JEHL, del Museo de San Diego, California (MILLIE, 1971; JOHNSON, 1972).
- 481 ***Pterodroma heraldica pascae** L'ENNERG Fardela Heráldica
Pterodroma (Aestrelata) heraldica pascae L'ENNERG, in Skottsberg's Nat. Hist. Juan Fernandez and Easter Islands, 3, pt. 1, 1920 (1921), p. 23 (Easter Island).
Otros nombres: Kakápa-Tahio (en Isla de Pascua).
Nidifica en Isla de Pascua.

ORDEN PELECANIFORMES

FAMILIA PHAETHONTIDAE

- 482 ***Phaethon rubricauda** BODDAERT Ave del Trópico de cola roja
Phaeton rubricauda BODDAERT, 1783, Table Pl. enlum., p. 57 (Mauricio)
 Otros nombres: Taváke (Isla de Pascua).
 Zona tropical y subtropical del Océano Pacífico, Océano Indico.
 Un ejemplar nidificando fue capturado en el islote de Motu-Maratui, Isla de Pascua (MILLIE y JOHNSON, 1970; JOHNSON, 1972).
 Posiblemente corresponda a la subespecie *melanorhynchus*, que nidifica en las Galápagos (SCHAUENSEE, 1966).
- 483 **Phaethon lepturus** DAUDIN Ave del Trópico de cola blanca
Phaeton lepturus DAUDIN, 1802, Buffon Hist. Nat., ed. Didot, Quadr., 14, p. 319 (Mauricio).
 Otros nombres: Taváke (Isla de Pascua).
 Mares tropicales. Su presencia ha sido detectada frente a la costa de Chile y en la Isla de Pascua (JOHNSON, 1972).

FAMILIA FREGATIDAE

- 484 ***Fregata minor** (GMELIN) Ave fragata
Pelecanus minor GMELIN, 1789, Syst. Nat., 1 pt. 2, p. 572 (Sin localidad tipo).
 Otros nombres: Makohe (Isla de Pascua).
 En Chile, sólo en Isla de Pascua y frente a los islotes de Salas y Gómez (GOODALL, JOHNSON y PHILIPPI, 1964; MILLIE y JOHNSON, 1970; JOHNSON, 1972).

FAMILIA SULIDAE

- 485 **Sula leucogaster** (BODDAERT) Piquero café
Pelecanus leucogaster BODDAERT, 1783, Table Pl. enlum., p. 57 Nº 973 (Cayenne).
 Habita las aguas de zonas tropical y subtropical. Cuatro ejemplares fueron observados a 195 millas frente a la costa de Arica, en agosto de 1972 (MILLIE, ARAYA y MAGNERE, 1973).

ORDEN CICONIIFORMES

FAMILIA ARDEIDAE

Género Florida BAIRD

Florida BAIRD, 1858, Rep. Expl. Surv. R. R. Pac.,
 9, pp. XXI, XXV, 671. Tipo, por monotipia,
Ardea caerulea LINNAEUS

- 486 **Florida caerulea** (LINNAEUS) Garza chica azul
Ardea caerulea LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., 10th ed. 1, p. 143 (Norteamérica, Carolina).
 Desde el sur de Norteamérica, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayanas, Brasil y Uruguay. En Chile fue observado un ejemplar adulto en Arica, octubre y noviembre de 1971 (LABERCOMBE y HILL, 1972), y un ejemplar joven en mayo de 1972, también en Arica (McFARLANE, 1972).

Género *Bubulcus* BONAPARTE*Bubulcus* (PUCHERAN MS.) BONAPARTE; 1855, Compt.

Rend. Acad. Sci. Paris, 40, N° 14, p. 722, abril.

Tipo por tautonomía, *Ardea ibis* "Hasselquist"(-LINNAEUS) = *Ardea bubulcus* AUDOUIN487 *Bubulcus ibis* LINNAEUS Gaiza bueyera*Ardea Ibis* LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1, p. 144 (Egipto).

Mayor parte de Europa, Africa y Asia, Australia, este y sur de Estados Unidos, América Central, norte de América del Sur, Perú, Bolivia y Brasil. En Chile, un ejemplar fue registrado en la costa de Antofagasta en enero de 1969 (BROWN, 1969; POST, 1970).

ORDEN ANSERIFORMES

FAMILIA ANATIDAE

488 *Anas discors* LINNAEUS Pato de ala azul*Anas discors* LINNAEUS, 1766, Syst. Nat. 12th ed., 1, p. 205 (Norteamérica, Carolina).

Nidifica en Norteamérica; en invierno emigra al sur, extendiéndose a través de América Central, Antillas y, por América del Sur, hasta Argentina (La Rioja y Buenos Aires). En Chile fue capturado un ejemplar al sur del Puerto de Los Vilos, provincia de Coquimbo, en octubre de 1965 (PHILIPPI, 1966).

ORDEN CHARADRIIFORMES

FAMILIA THINOCORIDAE

489 *Attagis gayi simonsi* CHUBB Perdicitia cordillerana boliviana*Attagis gayi simonsi* CHUBB, 1918, Bull. Brit. Orn. Cl., 38, p. 41 (Crucero, Perú)

Zona de la Puna desde Ecuador, Perú al norte de Chile (Tarapacá). Oeste de Bolivia y noroeste de Argentina, Jujuy (JOHNSON, 1967).

FAMILIA LARIDAE

SUBFAMILIA LARINAE

Género *Xema* LEACH

Xema LEACH, 1819, in ROSS, Voy. Disc. Baffin's Bay, App. 2, p. LVII. Tipo, por monotipia, *Larus sabini* SABINE

490 *Xema sabini* (SABINE) Gaviota de Sabine*Larus sabini* SABINE, 1819, Trans. LINN. Soc. Lond., 12, (2), p. 522, pl. 29 (Sabine cerca de Bahía Melville)

Nidifica en las regiones circumpolares del hemisferio Norte; en invierno emigra al sur hasta Perú, manteniéndose alejado de las costas. En Chile ha sido observado frente a Tarapacá (21° S.) en diciembre de 1968 y en febrero de 1970 a 20 millas al norte de Talcahuano (36° 30' S) por S. CHAPMAN (JOHNSON, 1972).

Género *Creagrus* BONAPARTE*Creagrus* BONAPARTE, 1854, Naumannia, p. 213.Tipo por designación original, *Larus furcatus* NEBOUX

- 491 *Creagrus furcatus* (NEBOUX) Gaviota de las Galápagos
 "Mouette á queue fourchue" NEBOUX, Rev. Zool., 3, p. 290, 1840.
Larus furcatus NEBOUX, 1846, Voy. "Venus", Atlas Zool., Ois.,
 lam. 10 (Rada de Monterrey, Alta California).
 Nidifica en las Islas Galápagos. En Chile ha sido observado por S.
 CHAPMAN en enero de 1970, a 23 millas frente a Chañaral, y en enero
 de 1971 frente a Algarrobo. JEHL, del Museo de Historia Natural de San
 Diego, California, capturó un ejemplar en junio de 1970 en Concepción
 (36° 12' S), y observó varios cerca de la Isla de San Ambrosio
 (JOHNSON, 1972).

SUBFAMILIA STERNINAE

- 492 **Sterna lunata* PEALE Gaviotín pascuense
Sterna lunata PEALE, 1848, U. S. Expl. Exped. 8. p. 277.
 Otros nombres: Manutara (Isla de Pascua).
 Zona tropical del Pacífico, Molucas, Hawai, Isla de Pascua.
- 493 **Anous stolidus pileatus* (SCOPOLI) Gaviotín pardo pascuense
Sterna pileata SCOPOLI, 1786, Del. Flor. et Faun. Insubr. fasc. 2, p. 92.
 Otros nombres: Tuáo (Isla de Pascua).
 Nidifica en islas tropicales del Océano Índico y Pacífico. En Chile se ha
 comprobado su nidificación en las islas de San Ambrosio, así como en los islotes Motu-Nui, Motu-Iti y Motu-Maratiri en Isla de
 Pascua (GOODALL, JOHNSON y PHILIPPI, 1964; MILLIE y JOHNSON,
 1970).
- 494 **Procelsterna cerulea skottsbergii* LOENBERG Gaviotín grisáceo
 pascuense.
Procelsterna caerulea skottsbergii LOENBERG, 1921, in Skottsberg's.
 Nat. Hist. Juan Fernández and Easter Ids., 3, pt. 1, p. 20 (Isla de Pascua).
 Otros nombres: Taví (en Isla de Pascua).
 En Isla de Pascua y Océano Pacífico Sur.
- Género *Gygis* WAGLER
Gygis WAGLER, 1832, Ibis, col. 1223. Tipo, por
 monotipia, *Sterna candida* GMELIN
- 495 **Gygis alba royana* MATHEWS Gaviotín hada pascuense
Gygis alba royana MATHEWS, 1912, Bds. Austr., 2, p. 443, pl. 119 (Isla
 Ascensión)
 Otros nombres: Kin-Kia (en Isla de Pascua).

ORDEN CUCULIFORMES

FAMILIA CUCULIDAE

Género *Coccyzus* VIEILLOT

Coccyzus VIEILLOT, 1816, Analyse, p. 28. Tipo Coucou de la Caroline Buffon = *Cuculus americanus* LINNAEUS.

- 496 *Coccyzus melacoryphus* VIEILLOT Cucullo de pico negro

Coccyzus melacoryphus VIEILLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 8, p. 271 (Paraguay).

En casi toda Sudamérica, llegando por el sur hasta Argentina, La Rioja, La Pampa y Buenos Aires. Islas Trinidad y Galápagos. En Chile fue capturado un ejemplar en Chinchorro, Arica, el 8 de mayo de 1960 (PHILIPP, 1968).

ORDEN APODIFORMES

FAMILIA APODIDAE

Género *Chaetura* STEPHENS

Chaetura STEPHENS, 1825, SHAW. Gen. Zool., XIII, p. 76
(*Hirundo pelagica* LINN.)

- 497 *Chaetura pelagica* (LINNAEUS) Vencejo de chimenea
Hirundo pelagica LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 192

Nidifica desde el Sur de Canadá hasta Texas y Florida; migra a América del Sur a través de Colombia y oeste de Venezuela hasta noroeste de Brasil y Lima, Perú. En Chile fueron capturados cuatro ejemplares cerca de Molinos, valle del Lluta, Arica, en diciembre de 1971 (ARAYA, MILLIE y MAGNERE, 1972).

FAMILIA TROCHILIDAE

Género *Thaumastura* BONAPARTE

Thaumastura BONAPARTE, 1850, Consp. Av. I, p. 85
Tipo *Ornismya cora* LESSON

- 498 *Thaumastura cora* (LESSON y GARNOT) Picaflor de Cora

Orthorhynchus Cora LESSON y GARNOT, Voy. "Coquille", Atlas, 1826 (1827), pl. 31, f. 4; Zool. 1, 1826 (1830), p. 682.

Oeste de Perú, desde el sur de Libertad a Arequipa. En Chile fueron observados 2 ejemplares en los alrededores del Hotel Azapa, Arica, entre el 6 y 8 de noviembre de 1971 (LAVERCOMBE y HILL, 1972).

ORDEN PASSERIFORMES

FAMILIA FURNARIIDAE

- 499 *Upucerthia andaecola* D'ORBIGNY y LAFRESNAYE Bandurrilla de las piedras.

Upucerthia (sic) *andaecola* D'ORBIGNY y LAFRESNAYE, 1838, Syn. Av., 2, in Mag. Zool., 8, cl. 2, p. 21 (Sicasica, La Paz, Bolivia).

Altos Andes de Bolivia, desde Chuquisaca a La Paz, noroeste de Argentina, en Jujuy y Catamarca. En Chile fue capturado un ejemplar en los Altos Andes de Antofagasta (JOHNSON, 1972).

FAMILIA TYRANNIDAE

Género *Pitangus* SWAINSON

Pitangus SWAINSON, 1826, Zool. Journ., 3, p. 165.

Tipo por designación original *Tyrannus sulphuratus* VIEILLOT = *Lanius sulphuratus* LINNAEUS.

Pitangus sulphuratus (LINNAEUS, 1766)

Sur de Texas, México, América Central, Trinidad, Zona Tropical, Guayanas, Venezuela y Colombia, excepto al oeste; hacia el sur hasta Argentina, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza (SCHAUSENSEE, 1966).

- 500 *Pitangus sulphuratus bolivianus* (LAFRESNAYE) Benteveo

Saurophagus bolivianus LAFRESNAYE, 1852, Rev. Mag. Zool., (2) 4, p. 463 (Chuquisaca, Bolivia).

Parte este de Bolivia, Chaco paraguayo y Argentina, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro. En Chile, un ejemplar capturado en julio de 1968, en las cercanías de Cholguán, prov. de Nuble (PHILIPPI, 1967).

Género *Tyrannus* LACEPEDE

Tyrannus LACEPEDE, 1799, Tabl. Oiseaux, p. 5

Tipo "Le Tiran" BUFFON *Lanius tyrannus* LINNAEUS

- 501 *Tyrannus tyrannus* (LINNAEUS) Pájaro Rey

Lanius tyrannus LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., 10th. ed., 1 p. 94. Basado en *Muscicapa corona rubra* CATESBY, Nat. Hist. Carolina, 1, p. 55, pl. 55 (Carolina).

Nidifica entre el sur de Canadá, Nueva México y Florida. Migra al sur por el oeste de América Central y del sur hasta Perú, Bolivia y noroeste de Argentina. Un ejemplar capturado en Chinchorro, Arica, en mayo de 1960 (PHILIPPI, 1967), observado posteriormente en Santo Domingo, noviembre de 1967, y en Antofagasta en abril de 1968 (JOHNSON, 1972).

FAMILIA TURDIDAE

Género *Catharus* BONAPARTE

Catharus BONAPARTE, 1851, Consp. Av., 1
p. 278. Tipo por monotipia *Turdus*
inmaculatus BONAPARTE = *Turdus*
aurantiiostris HARTLAUB.

502 *Catharus fuscescens* (STEPHENS) Zorzal selvático

Turdus fuscescens STEPHENS. 1817 in SHAW, Gen. Zool., 10, (1). p. 182.
Basado en *Turdus mustelinus* WILSON (no de GMELIN), Amer. Orn., 5,
p. 98, pl. 43, Fig. 3; 1812.

Nidifica en el sur de Canadá y Estados Unidos y noroeste de Arizona y Georgia; migra a través de América Central a Guayana Británica, Venezuela, norte de Colombia y Brasil. Accidental en Curacao. En Chile, un ejemplar capturado por R. W. McFARLANE el 17 de marzo de 1973 en Chapisca, Valle de Lluta, Arica. Ejemplar N° 4445 Colecc. Museo Nac. Hist. Nat.

FAMILIA HIRUNDINIDAE

Género *Riparia* FORSTER

Riparia FORSTER, 1817, Synop. Cat. Brit. Birds. p. 17
Tipo por monotipia y tautonimia, *Riparia europaea*
= *Hirundo riparia* LINNAEUS

503 *Riparia riparia* (LINNAEUS) Golondrina barranquera

Hirundo riparia LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 192 (Europa = Suecia).

Nidifica en la zona templada del hemisferio norte. En Norteamérica lo hace en Canadá y Estados Unidos; migra, a través de México y América Central, a Guayana Británica, Venezuela, Colombia, este de Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina. Ha sido observado en Chile en diciembre de 1968, y en 1971, en la oficina Pedro de Valdivia, Antofagasta, y en Llifén, Valdivia (JOHNSON, 1972).

FAMILIA COEREBIDAE

504 *Conirostrum tamarugensis* JOHNSON y MILLIE Comesebo de los Tamarugos

Conirostrum tamarugensis JOHNSON y MILLIE, 1972, Supl. Birds of Chile and Adj. Regs. Platt. Establ. Gráf. Bs. As., 1 lam., p. 4.

Encontrado por primera vez en plantación de tamarugos cerca de Pintados (20° 30' S), prov. de Tarapacá. Un ejemplar macho capturado el 9 de diciembre de 1970 y 3 machos y 1 hembra el 14 y 17 de diciembre de 1971.

FAMILIA THRAUPIDAE

Género *Piranga* VIEILLOT

Piranga VIEILLOT, 1807, Hist. Nat. Ois. Amér. Sept., 1,
p. IV. Tipo por monotipia, *Muscicapa rubra* LINNAEUS
1776 = *Fringilla rubra* LINNAEUS, 1758
Piranga rubra (LINNAEUS, 1758)

Nidifica en Norteamérica desde el sureste de California,
sur de Nebraska, Indiana y Ohio a Delaware, Florida y México.
En invierno migra a Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador,
este de Perú, noroeste de Bolivia y Brasil. Trinidad.

505 *Piranga rubra rubra* (LINNAEUS)

Fringilla rubra LINNAEUS, 1758, Syst. Nat. 10th ed., 1, p. 181. Basado
en "The summer Red-Bird" CATESBY, Nat. Hist. Carolina, 1, p. 58, pl.
56x.

Nidifica al este de Estados Unidos y Norte de México, en invierno migra
a través de América Central hasta Perú, Bolivia y oeste de Brasil. En
Chile fue encontrado un ejemplar momificado, en enero de 1967, en Es-
tación La Negra, Antofagasta. Depositado en el Museo Nacional de His-
toria Natural de Santiago.

FAMILIA ICTERIDAE

Género *Dolichonyx* SWAINSON

Dolichonyx SWAINSON, 1827, Phil. Mag., (n. s.), 1, Nº 6, p. 435,
jun. Tipo por monotipia, *Fringilla oryzivora* LINNAEUS; idem. Zool.
Journ. 3, Nº 11, Sept., dec., p. 351, 1827 (caracteres de género).

506 *Dolichonyx oryzivorus* (LINNAEUS)

Fringilla oryzivora LINNAEUS, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1, p. 179. Basado
en "Hortulanus Carolinensis" CATESBY, Nat. Hist. Carolina, 1, p. 14; pl.
14, y "Emberiza carolinensis" KLEIN, Hist. Av. Prodr., p. 92, (Cuba y Ca-
rolina = Carolina del Sur.)

Nidifica en Norteamérica desde el sur de Canadá a Oregon, Kansas,
Ohio y Nueva Jersey. Migra a Sudamérica hasta Perú, Bolivia, Parag-
way y norte de Argentina. En Chile, un ejemplar fue observado por
HOWELL el 15 de diciembre de 1968 en la Oficina Pedro de Valdivia,
Antofagasta. (JOHNSON, 1972).

FAMILIA FRINGILLIDAE

SUBFAMILIA CARDUELINAE

507 *Catamenia inornata* (LAFRESNAYE) Fringilio semillero plebeyo

Linaria inornata LAFRESNAYE, 1847, Rev. Zool., 10, p. 75 (Bolivia)

Zona templada y puna de los Andes, desde Venezuela a Argentina, Jujuy
a Mendoza. En Chile fueron observados algunos ejemplares en Mamifía,
Tarapacá, en agosto de 1968 y 1969 (JOHNSON, 1970).

SUBFAMILIA EMBERIZINAE

508 *Diuca diuca chilensis* PHILIPPI-B y PEÑA *Diuca de Chiloé*

Diuca diuca chilensis PHILIPPI-B y PEÑA, 1964, 2º Supl. Aves de Chile, p. 447, Platt. Establ. Gráf. Bs. As. (Dalcahue-Mocopulli Chiloé). Tipo en Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Chile.

Endémico de Isla Grande de Chiloé.

509 *Phrygilus alaudinus bipartitus* ZIMMER *Platero peruano*

Phrygilus alaudinus bipartitus ZIMMER, 1924, Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser., 12, p. 61 (Cajamarca, Perú).

Zona templada de los Andes, desde el oeste de Ecuador, Perú, al oeste de Bolivia. En Chile, observado en Putre, norte de Tarapacá, en diciembre de 1971 (LAVERCOMBE y HILL, 1972).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ARAYA, B., G. MILLIE y O. MAGNERE
- 1972 Un vencejo nuevo para Chile *Chaetura pelagica* (LINNAEUS, 1758) (Apodiformes, Apodidae). Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 16 (188):11
- BROWN, A. J.
- 1969 Garza europea llega a Chile. Bol. Ornít. 1 (4): 6
- GOODALL, J. D., A. W. JOHNSON y R. A. PHILIPPI B.
- 1951 Las Aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Platt. Establ. Gráf. Bs. As. 2:1-445
- 1964 2º Suplemento de las Aves de Chile. Platt. Establ. Gráf. Bs. As. 443-521
- HUMPHREY, P. S. et al.
- 1970 Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Prelim. SMITH. Manual, Univ. Kans. Mus. Nat. Hist. LAWRENCE. 411 p.
- JOHNSON, A. W.
- 1965 The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt. Establ. Gráf. Bs. As. 1:398
- 1967 The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt. Establ. Gráf. Bs. As. 2:447
- 1970 Aves observadas en Mamiña (Tarapacá) desde el 15 al 30 de agosto de 1968 y 1969. Bol. Ornít. 2(1): 1-2
- 1972 Supplement to the Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt. Establ. Gráf. Bs. As.
- LAVERCOMBE, B. J. y C. HILL
- 1972 Aves observadas en la provincia de Tarapacá, incluyendo el hallazgo de dos especies y una subespecie nuevas para Chile. Bol. Ornít. 4(1): 1-7
- McFARLANE, R.
- 1972 Segundo hallazgo en Chile de la pequeña garza azul. Bol. Ornít. 4(2): 3
- MEYER DE SCHAUENSEE, R.
- 1966 The species of Birds of South America and their distribution. Acad. Nat. Bos. Livingston Publ. 578 p.
- 1971 A guide to the Birds of South America. Oliver & Boyd, Edinburgh.
- MILLIE, G. y A. W. JOHNSON
- 1970 Aves de la Isla de Pascua. Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 14(164): 6-10
- MILLIE, G.
- 1971 Trip to Chiloé Island: August 26-September 9th. 1971. Bol. Ornít. Santiago, 3(2):2
- MILLIE, G., B. ARAYA y O. MAGNERE
- 1973 Un piquero nuevo para los mares chilenos, *Sula leucogaster*. (BODDAERT, 1783) Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 17(200):9-10
- PHILIPPI B., RODOLFO A.
- 1964 Catálogo de las aves chilenas con su distribución geográfica. Inv. Zool. Chilenas 11: 1-179
- 1966 El pato de ala azul *Anas discors* capturado por primera vez en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 29(3):45-47
- 1967 Tres especies de aves capturadas por primera vez en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 29(7):121-124
- 1968 Un nuevo cuclillo para Chile *Coccyzus melacoryphus* VIEILLLOT. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 29(9): 129-130
- POST, P.
- 1970 First report of Cattle Egret in Chile and range extensions in Perú. Auk 87(2): 361.