

ORNITOLOGÍA CHILENA

CONTRIBUCIONES

POR

Cárlos F. RAHMER

I.—OBSERVACIONES SOBRE EL *MOLOTHRUS BONARIENSIS*, Gm. (Tordo Argentino)

El Tordo arjentino ha sido siempre una especie mui rara en Chile i no hallándosele en el país, se le consideró estraviado.

En la obra de GAY (Tom. I, páj. 347) se encuentra la corta nota siguiente: «Esta ave se halla en el Brasil i en Chile».

En el *Catálogo de las Aves chilenas*, publicado por el doctor R. A. PHILIPPI en los «Anales de la Universidad», del año 1868, encuentro en páj. 23 la anotacion: «Esta especie, mui comun en la República Arjentina, se halla mui raras veces en Chile, i sabemos sólo de dos ejemplares muertos en la provincia de Santiago, desde que estamos en la capital». Dos ejemplares, macho i hembra, existen en la coleccion del Museo, que son los mencionados arriba, segun aseveracion verbal del señor Landbeck.

A mediados del mes de Setiembre de 1909, encontré en una de las calles de Rancagua un vendedor ambulante que llevaba en una jaula ocho tordos arjentinos, todos machos, que consideré al principio importados. Sin embargo, la persona me aseguró de haberlos cazado en trampa en los cerros de Machalí, pueblo al oriente de Rancagua i distante 3 leguas mas o ménos, agregando que volaban en una bandada bastante numerosa. Todas mis pesquisas en este año fueron estériles; parece que la bandada se repartió por un vasto terreno i no pude observar un solo ejemplar.

En Octubre de 1910 se presentó el tordo arjentino en los mismos parajes, pero en mayor número, así que se vendieron muchos, i esta vez tambien hembras. La mayor abundancia se debe sin duda al año seco i la falta de nieve en la cordillera. Este año observé varias veces machos en

las cercanías de Machalí i una vez un macho cerca de los Baños de Cauquénés.

Don Arturo de Toro i Herrera me mandó el día 25 de Enero de 1911 un pájaro, cazado en su fundo Bella-Vista, del cual me dijo que le era desconocido. Grande satisfaccion esperiménté al encontrar que era un macho nuevo de *Molothrus bonariensis*. Este hallazgo prueba su incubacion durante la temporada de 1910-1911.

El plumaje es mui parecido al de la hembra, ménos el color del iris, que es de un bruno-ceniciento, miéntras el ojo de la hembra adulta es pardo-oscuro, casi negro. La misma diferencia se nota en el color del pié, en la hembra adulta negro, en el macho nuevo, pardo-carnoso.

A fines de Setiembre de 1911 llegaron grandes bandadas, que se repartieron a mediados de Octubre en compañías de 4 a 7 individuos; no era nada raro observarlas cerca de los grandes zarzales, entre la hacienda «El Sauzal» i los Baños de Cauquénés, acompañando las diucas (*Diuca grisea*), pero jamas he visto mezclarse con los tordos comunes (*Curaeus aterrimus*). Los machos, aunque algo ariscos, se ven con frecuencia, miéntras tanto las hembras se esconden, de tal manera, que es sumamente dificultoso observarlas; además, su tamaño i plumaje mui parecido a la diuca, la hace desaparecer o confundir a cierta distancia; i ésta la saben conservar perfectamente.

Sin duda, lo mas interesante en nuestra ave es su vida matrimonial poliándrica. Cada hembra vive con 5 o 6 machos, pone sus huevos de a uno en los nidos de las diucas (por eso la amistad); o tambien en nidos de Tencas (*Mimus thenca*), caso que observé i conservo el huevo en mi colección. Corroboro la nota del señor Quijada en el «Boletin del Museo» sobre la incubacion de nuestra ave.

El huevo del Tordo argentino es de un color blanco-verdoso con mui pocas manchitas pequeñas de un pardusco-claro mui débil, repartido irregularmente, i en escaso número, por toda la cáscara. Sus dimensiones son las siguientes:

Eje longitudinal.....	27 mm
» transversal.....	19 »

Su grano un poco mas áspero que el del Tordo comun. Su tamaño mas pequeño que el huevo de la Tenca i bastante mas que el del Tordo comun. La diferencia entre las tres clases de huevos mencionados, considerando

color jeneral, pintas i tamaño, salta a la vista al primer instante. Ví entrar i salir del nido la hembra del Tordo arjentino, recojiendo el huevo todavía tibio, junto con dos mas de Tenca.

Cábeme todavía decir algo sobre su utilidad. Hasta ahora no puede considerarse a esta ave como dañina, pues su alimento se constituye casi esclusivamente de pequeños Acridios, que se presentaban este año en enormes cantidades.

Posteriores observaciones tendrán que comprobar si el Tordo arjentino queda definitivamente enrolado entre las Aves chilenas.

En este caso, de sumo interes seria averiguar su migracion en Otoño. ¿Pasarán los nacidos en Chile por la cordillera al otro lado, o seguirán en la falda occidental para el Norte? Sucediendo lo último tendríamos la completa aclimatizacion de la especie en el pais.

RANCAGUA, Marzo 27 de 1912.

